


ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0188491 del 24/09/2021 - 14:59



A tutti i Sindaci del Territorio
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

E p.c. Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttori Distretti Sociosanitari

Direttori Medici Responsabili dei PP.VV.OO.

A tutti i referenti PP.VV.PP.

Al Coordinatore Unità Mobili COVID

Dr. Antonio Coppola

Direttore UOC Nefrologia E Dialisi P.O. San Leonardo

Dr.ssa Maria Rita Auricchio

Direttore UOC Medicina Interna P.O. San Leonardo

Dr. Carmine Coppola

Cabina di Regia campagna Vaccinale Anticovid

Cabina Regia Vaccini

Oggetto: Campagna vaccinale ANTICOID 19 Vaccinazioni aggiuntive e dosi di richiamo

In ottemperanza a quanto disposto:

- Nella circolare del Ministero della Salute del 14 settembre 2021 “- indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi aggiuntive e di dosi "booster" (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.”;
- Nella nota regionale del 15 settembre 2021 “Dosi aggiuntive di vaccini contro il Sars-Cov-2 – Disposizioni”;
 - E' prevista una **dose aggiuntiva** intendendosi una dose aggiuntiva di vaccino a **completamento del ciclo vaccinale primario**, somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria ai cittadini con le seguenti caratteristiche:
 - Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);

- In Attesa di trapianto d'organo;
- In Terapia a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico.

Sulla base delle indicazioni fornite in precedenza, tali soggetti dovrebbero aver già ricevuto due dosi di vaccino a m-RNA; comunque, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen), considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di AIFA (che tengono conto delle attuali informazioni in ambito regolatorio relative alle dosi aggiuntive), sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia: **Comirnaty di BioNTech/Pfizer** nei soggetti di età ≥ 12 anni e **Spikevax** di Moderna nei soggetti di età ≥ 18 anni.

La dose addizionale va somministrata dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose.

- ✦ **Per dose di richiamo** si intende una dose successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, a distanza di un determinato intervallo temporale, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, in particolare in popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità che si associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale. **somministrata dopo almeno sei mesi dall'ultima dose.**

La dose di richiamo va

Nel territorio dell' Asl Napoli 3 Sud, in base alle disposizioni regionali, dal 20 settembre è iniziata la somministrazione **della dose addizionale** nei soggetti trapiantati e immunocompromessi e la somministrazione di **una dose di richiamo** di vaccino a m-RNA (Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna) in favore dei cittadini ultraottantenni e dei pazienti delle R.S.A.

Per le persone ricoverate in RSA (Residenze Sanitarie Assistite) si seguirà la stessa procedura utilizzata per le vaccinazioni prima e seconda dose. Le strutture saranno contattate dall'Asl Napoli 3 Sud per l'organizzazione della dose di richiamo.

Responsabile: Dr. Antonio Coppola Email: rsacovid@aslnapoli3sud.it



I **cittadini ultraottantenni** che sono trasportabili ed autonomi, possono recarsi presso qualsiasi punto vaccinale presente sul territorio dell'Asl Napoli 3 Sud, tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.00 senza prenotazione (si allega alla presente elenco PP.VV.TT.)

Per i **cittadini ultraottantenni a domicilio** si seguirà la stessa procedura utilizzata per le vaccinazioni prima e seconda dose. I cittadini saranno contattati dall'Asl Napoli 3 Sud per organizzare la dose di richiamo, secondo la progressione ed il calendario della prima dose.

Responsabile: Dr. Antonio Coppola - Email: rsacovid@aslnapoli3sud.it

Per i **pazienti dializzati** seguiti nei centri assistenza dialisi presenti sul territorio dell'Asl Napoli 3 Sud, sarà garantito il completamento del primo ciclo vaccinale con una dose aggiuntiva secondo le modalità già utilizzate per la prima e la seconda dose.

Responsabile: Dr.ssa Maria Rita Auricchio - email: pocast.nefr@aslnapoli3sud.it

Per i **pazienti trapiantati di Fegato** seguiti dalla UOC Medicina Interna/ Centro fegato del Presidio Ospedaliero C/mmare- Gragnano sarà garantito il completamento del primo ciclo vaccinale con una dose aggiuntiva secondo le modalità già utilizzate per la prima e la seconda dose.

Responsabile: Dr. Carmine Coppola - email epatologiagragnano@aslnapoli3sud.it

I cittadini, per approfondimenti organizzativi, potranno rivolgersi al n° 0819633169 o direttamente al punto vaccinale più vicino.

Ringrazio per la sicura e consueta collaborazione.

Direttore Sanitario
Dr. Gaetano D'Onofrio

